HELIOS Klinikum Berlin – Robert-Rössle-Klinik
Charité – Campus Berlin-Buch • D -13122 Berlin

Charité

UNIVERSITÄTSKLINIKUM
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
DER HUMBOLDT-UNIVERSITÄT
CAMPUS BERLIN-BUCH

Name: _____

Vorname: _____

Geb. – Datum: _____

Adresse: _____

Krankenkasse: _____

Funktionsbereich Radiodiagnostik
Leiter: Univ.-Prof. Dr. h. c. R. Felix

**Fachambulanz für diagnostische und
interventionelle Radiologie**

Röntgendiagnostik
Tel. (030) 94 17 - 1265
Fax (030) 94 17 - 1281
Email: gebauer@rrk-berlin.de

Patientenaufklärung über Chemoembolisation

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient

Ihr behandelnder Arzt hat Sie zu uns mit der Bitte überwiesen, bei Ihnen eine transarterielle Chemoembolisation (TACE) durchzuführen. Dabei wird nach Lokalanästhesie der Leiste die Arterie punktiert und ähnlich der Angiographie/Herzkatheter ein Katheter in die Leberarterie vorgeschoben. Dabei haben Sie in der Regel keine Schmerzen oder Unwohlsein. Über den Katheter wird selektiv in den Lebertumor das Chemotherapeutikum (i.d.R. Doxorubicin und Cisplatin) mit einem Kontrastmittel (i.d.R. Lipiodol) appliziert, anschließend erfolgt mit Hilfe eines Stärkepartikels eine temporäre Okklusion der kleinen Tumorarterien, damit das Chemotherapeutikum in die Zellen aufgenommen wird. Zum Abschluß der Untersuchung werden der Katheter und alle Materialien entfernt und ein Druckverband angelegt. Sie haben dann für insgesamt 24 Stunden strenge Bettruhe.

Wie bei anderen medizinischen Eingriffen, so kann es auch bei der Chemoembolisation (TACE) zu Komplikationen durch den Eingriff oder die Chemotherapie kommen. Komplikationen des Eingriffs sind zum einen **Blutung, Bluterguß** und zum anderen **Infektionen**, manchmal auch mit **Abzeßbildung**. Durch den Katheter kann es zu einer **Gefäßverletzung** oder zur Bildung von **Gerinnseln** mit Verschleppung der Gerinnsel (Embolie) kommen. In seltenen Fällen kann es zu einer vorübergehenden oder längerfristigen **Verschlechterung der Leberfunktion** mit **Gerinnungsstörungen**, starker **Blutungsneigung** und ggf. auch **Gelbsucht** kommen. Nach der Embolisation kann es durch den Untergang von Gewebe und dem Chemotherapeutikum zu **Fieber, Schüttelfrost** und **starken Schmerzen**, ggf. mit **Übelkeit** und **Erbrechen** kommen (Postembolisationssyndrom). **Allergische Reaktionen** bis zum Schock auf das Kontrastmittel oder andere verwendete Stoffe sind möglich.

Bitte seien Sie durch diese Aufklärung nicht beunruhigt. Wir sind heute im Sinne der Wahrung Ihrer persönlichen Rechte gehalten, Sie über mögliche Komplikationen zu informieren und benötigen zur Chemoembolisation Ihr Einverständnis.

Zuvor bitten wir Sie noch, einige Fragen zu beantworten.

Haben Sie bei einer früheren Röntgenuntersuchung bereits ein Kontrastmittel erhalten (z.B. Herzkatheter, Beinvenendarstellung)? nein ja

Sind hierbei Zeichen einer Unverträglichkeit aufgetreten? nein ja

Ist bei Ihnen eine Allergie (Heuschnupfen, Asthma etc.) bekannt? nein ja

Ist bei Ihnen eine Nierenfunktionsstörung bekannt? nein ja